



III.

Fig. I.

Fig.

V

Fig. II.

IX

Fig. VII.

Fig.

*D. Iacobi Christiani Schaefferi
Icones insectorvm ...*



III.

Fig. I.

Fig.

V

Fig. II.

IX

Fig. VII.

Fig.

*D. Iacobi Christiani Schaefferi
Icones insectorvm ...*

CR. A. 3/1



E. BIBL. RADCL.

7/3
5/1
3/2

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI
 I C O N E S
 INSECTORVM RATISBONENSIVM

METHODO SYSTEMATICA
 ILLUSTRATAE
 ET
 INDICE SYSTEMATICO AVCTAE

A
 D. GEORG. WOLFGANGO FRANCISCO PANZERO

REIPVBL. NORIMBERGENS. PHYSICO ORDINARIO ACAD. IMPER. NAT. CURIOS.
 ACAD. SCIENT. ERFORDENS. SOCIET. HISTOR. NATVR. PARIS. BEROLIN.
 DANTISC. JEN. GOETTING. BVRGHVS. PHYTOGRAPH. GOETTING.
 BOTAN. RATISBON. ET FLORIGERAE AD PEGNES.
 NORIMBERG. SOCIO.

EDITIO NOVA
 TOMVS PRIMVS.

ERLANGAE
 IN BIBLIOPOLIO J. J. PALMII MDCCCIV.

INSECTA
RATISBONENSIA.
VOL. I.

Regensburgische
Insecten.
Erster Band.

TABVLA I.

Erste Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX PRIMVS.
Erfter Holzkäfer.
- Fig. II. COCCINELIA PRIMA.
Erfter Blattlauskäfer.
- Fig. III. CHRYSOMELA PRIMA.
Erfter Blattkäfer.
- Fig. IV. SARABAEVS tribus antennarum lamellis PRIMVS.
Erfter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühkhörnern.
- Fig. V. VI. PHALAENA feticornis alis planis PRIMA.
Erfter Nachtfalter mit borftigen Fühkhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VII. STENOCORVS thorace inermi PRIMVS.
Erfter Stutzkäfer mit fachellofem Bruftfchilde.
- Fig. VIII. IX. SPHINX alis integris cauda fimplici PRIMA.
Erfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. X. ICHNEVMON PRIMVS.
Erfte Schlupfwefpe.
- Fig. XI. a. b. CVRCVLIO femoribus dentatis PRIMVS.
Erfter Rüffelkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. XII. a. b. CVRCVLIO femoribus dentatis SECVNDVS.
Zweyter Rüffelkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. XIII. CARABVS onatus PRIMVS.
Erfter eyrunder Laufkäfer.

TABULA I.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.

Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. X.




Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. XIII.



Fig. XII.



Labid. pum. Rat.

G. P. Trautner sc. Norimb.

TABULA II.



et puer Rat

Trautner de Norimb

TABVLA II.

Zweyte Tafel.

- Fig. I. **BVPRESTIS PRIMA.**
Erster Stinkkäfer.
- Fig. II. **STAPHYLINVS PRIMVS.**
Erster Raubkäfer.
- Fig. III. **CIMEX quinque antennarum articulis PRIMVS.**
Erste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. **LIBELLVLA alis patentibus PRIMA.**
Erstes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. V. **ELATER antennis pectinatis PRIMVS.**
Erster Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VI. **ELATER antennis pectinatis SECVNDS.**
Zweyter Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VII. **LEPTVRA thorace globofo PRIMA.**
Erster Asterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. VIII. **LEPTVRA thorace globofo SECVNDA.**
Zweyter Asterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IX. **LEPTVRA thorace globofo TERTIA.**
Dritter Asterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. X. **STENOCORVS thorace armato PRIMVS.**
Erster Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. XI. **CVRCVLIO femoribus muticis PRIMVS.**
Erster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. XII. **CVRCVLIO femoribus muticis SECVNDS.**
Zweyter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA III.

Dritte Tafel.

- Fig. I. *CARABVS oblongus PRIMVS.*
Erster länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. *CARABVS oblongus SECVNDVS.*
Zweyter länglicher Laufkäfer.
- Fig. III. *DYTICVS PRIMVS.*
Erster Schwimmkäfer.
- Fig. IV. *CHRYSOMELA SECVNDA.*
Zweyter Blattkäfer.
- Fig. V. *MELOE PRIMVS.*
Erster Mayenwurmkäfer.
- Fig. VI. *MELOE SECVNDVS.*
Zweyter Mayenwurmkäfer.
- Fig. VII. *COPRIS muticus PRIMVS.*
Erster ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. VIII. *COPRIS muticus SECVNDVS.*
Zweyter ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. IX. *ATTELABVS PRIMVS.*
Erster Schildkrötenkäfer.
- Fig. X.XI.XII. *PHRYGANEA PRIMA.*
Erste Frühlingsfliege.
- Fig. XIII. *STENOCORVS thorace inermi SECVNDVS.*
Zweyter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABULA III.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. IIX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. XIII.



TABULA IV.



Tabula IV. Vierte Tafel.

- Fig. I. *LIBELLULA* alis *patentibus* *SECUNDA*.
Zweytes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. *LEPTVRA* thorace *globoso* *QUARTA*.
Vierter Aetherholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. III. *LEPTVRA* thorace *globoso* *QUINTA*.
Fünfter Aetherholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IV. *CRIOCERIS* *PRIMA*.
Erster Lilienkäfer.
- Fig. V. *CRIOCERIS* *SECUNDA*.
Zweiter Lilienkäfer.
- Fig. VI. *ELATER* antennis *ferratis* *PRIMVS*.
Erster Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. *ELATER* antennis *ferratis* *SECUNDVS*.
Zweiter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. *CICINDELA* *PRIMA*.
Erster Zangenkäfer.
- Fig. IX. X. *VROCERVS* *PRIMVS*.
Erste Schwanzfliege.
- Fig. XI. *STAPHYLINVS* *SECUNDVS*.
Zweiter Raubkäfer.
- Fig. XII. *LEPTVRA* thorace *plano* *PRIMA*.
Erster Aetherholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. XIII. *LEPTVRA* thorace *plano* *SECUNDA*.
Zweiter Aetherholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. XIV. *TETIGONIA* *PRIMA*.
Erste Singfliege.

TABVLA V. Fünfte Tafel.

- Fig. I. **SCARABAEVS** *tribus antennarum lamellis* **SECUNDVS.**
Zweyter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. **ICHNEVMON** **SECUNDVS.**
Zweyte Schlupfwespe.
- Fig. III. IV. **FORMICA** **PRIMÆ. FEMINA ET MAS.**
Erste Ameise. Weibgen und Männchen.
- Fig. V. VI. **HEPA** **PRIMA.**
Erster Wafferfcorpion.
- Fig. VII. VIII. **HEMEROBIVS** **PRIMVS.**
Erfter Blattlauslöwe.
- Fig. IX. X. **CIMEX** *quinque antennarum articulis* **SECUNDVS.**
Zweyte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. **CIMEX** *quinque antennarum articulis* **TERTIVS.**
Dritte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABULA V.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. VI.




Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



L. I. R.

G. P. Fournier.

TABULA VI.



J. Wandelaar del.

TABVLA VI.

Sechste Tafel.

- Fig. I. MELOLONTHA PRIMA.
Erster Sägenblattkäfer.
- Fig. II. MELOLONTHA SECUNDA.
Zweyter Sägenblattkäfer.
- Fig. III. MELOLONTHA TERTIA.
Dritter Sägenblattkäfer.
- Fig. IV. RHINOMACER PRIMVS.
Erster Afterrüsselkäfer.
- Fig. V. LIBELLVLA alis patentibus TERTIA.
Drittes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. VI. VII. MELOLONTHA QVARTA.
Vierter Sägenblattkäfer.
- Fig. VIII. PLATYCERVS PRIMVS.
Erster Kammkäfer.
- Fig. IX. STENOCORVS thorace inermi TERTIVS.
Dritter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. X. LIBELLVLA alis patentibus QVARTA.
Viertes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. XI. ICHNEVMON TERTIVS.
Dritte Schlupfwespe.
- Fig. XII. ICHNEVMON QVARTVS.
Vierte Schlupfwespe.
- Fig. XIII. ICHNEVMON QVINTVS.
Fünfte Schlupfwespe.

TABVLA VII.

Siebende Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris PRIMVS.*
Erster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. *TENTHREDO antennis clauatis PRIMA.*
Erste Sägfliche mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *TENTHREDO antennis clauatis SECUNDA.*
Zweyte Sägfliche mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. V. *TENTHREDO antennis clauatis TERTIA.*
Dritte Sägfliche mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *TENTHREDO antennis filiformibus PRIMA.*
Erste Sägfliche mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. VII. *TENTHREDO antennis pectinatis PRIMA.*
Erste Sägfliche mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VIII. *TENTHREDO antennis clauatis QUARTA.*
Vierte Sägfliche mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. *TENTHREDO antennis clauatis QUINTA.*
Fünfte Sägfliche mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *TENTHREDO antennis setaceis PRIMA.*
Erste Sägfliche mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. *TENTHREDO antennis setaceis SECUNDA.*
Zweyte Sägfliche mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *TENTHREDO antennis filiformibus SECUNDA.*
Zweyte Sägfliche mit fadenähnlichen Fühlhörnern.

TABULA VII.



TABULA VIII.



G. P. Faustner sc. Norimb.

TABVLA VIII.

Achte Tafel.


- Fig. I. TABANVS PRIMVS.
Erste Bremsenfliege.
- Fig. II. STENOCORVS thorace armato SECUNDVS.
Zweyter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. III. STENOCORVS thorace armato TERTIVS.
Dritter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. IV, V, VI. TABANVS SECUNDVS.
Zweyte Bremsenfliege.
- Fig. VII. DYTICVS SECUNDVS.
Zweyter Schwimmkäfer.
- Fig. VIII. DYTICVS TERTIVS.
Dritter Schwimmkäfer.
- Fig. IX. DYTICVS QVARTVS.
Vierter Schwimmkäfer.
- Fig. X. DYTICVS QVINTVS.
Fünfter Schwimmkäfer.
- Fig. XI. ASILVS PRIMVS.
Erste Raubfliege.
- Fig. XII. ASILVS SECUNDVS.
Zweyte Raubfliege.
- Fig. XIII. ASILVS TERTIVS.
Dritte Raubfliege.
- Fig. IV. ASILVS QVARTVS.
Vierte Raubfliege.
- Fig. XV. ASILVS QVINTVS.
Fünfte Raubfliege.

TABVLA IX.

Neunte Tafel.


- | | |
|---------------|---|
| Fig. I. | PRIONVS PRIMVS.
<i>Erster Sägenholzkäfer.</i> |
| Fig. II. III. | HEMEROBIVS SECVNDVS.
<i>Zweyter Blattlauslöwe.</i> |
| Fig. IV. | SILPHA PRIMA.
<i>Erster Aaskäfer.</i> |
| Fig. V. VI. | EPHEMERA PRIMA.
<i>Erste Uferasfliege.</i> |
| Fig. VII. | COCCINELLA SECVNDA.
<i>Zweyter Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. VIII. | COCCINELLA TERTIA.
<i>Dritter Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. IX. | COCCINELLA QVARTA.
<i>Vierter Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. X. | COCCINELLA QVINTA.
<i>Fünfter Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. XI. | COCCINELLA SEXTA.
<i>Sechster Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. XII. | COCCINELLA SEPTIMA.
<i>Siebender Blattlauskäfer.</i> |
| Fig. XIII. | LIBELLVLA alis <i>patentibus</i> QVINTA.
<i>Fünftes Jüngferchen mit offenen Flügeln.</i> |
| Fig. XIV. XV. | PHALAENA <i>feticornis</i> alis <i>planis</i> SECVNDA.
<i>Zweyter Nachtfalter mit vorstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.</i> |

TABULA IX.



G. F. Fournier sc. Norim.

TABULA X.



G. P. Frautner sc.

TABVLA X. Zehende Tafel.


- Fig. I. CERAMBYX SECUNDVS.
Zweyter Holzkäfer.
- Fig. II. III. VROCERVS SECUNDVS.
Zweyte Schwanzfliege.
- Fig. IV. V. VOLVCELLA PRIMA.
Erste Federbuschfliege.
- Fig. VI. VOLVCELLA SECUNDA.
Zweyte Federbuschfliege.
- Fig. VII. VOLVCELLA TERTIA.
Dritte Federbuschfliege.
- Fig. VIII. VOLVCELLA QUARTA.
Vierte Federbuschfliege.
- Fig. IX. VOLVCELLA QUINTA.
Fünfte Federbuschfliege.
- Fig. X. XI. NECYDALIS PRIMVS.
Erster Fliegenkäfer.

TABVLA XI.

Eilfte Tafel.

- Fig. I. CARABVS *oblongus* TERTIVS.
Dritter länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. CARABVS *oblongus* QVARTVS.
Vierter länglicher Laufkäfer.
- Fig. III. CRABRO PRIMVS.
Erste Kolbenfliege.
- Fig. IV. CRABRO SECVNDVS.
Zweyte Kolbenfliege.
- Fig. V. VI. HIPPOBOSCA PRIMA.
Erste Pferdfliege.
- Fig. VII. CERAMBYX TERTIVS.
Dritter Holzkäfer.
- Fig. VIII. ELATER *antennis ferratis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. ELATER *antennis ferratis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. X. XI. XII. CIMEX *quinque antennarum articulis* QVARTVS.
Vierte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. CARABVS *ovatus* SECVNDVS.
Zweyter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XIV. CARABVS *ovatus* TERTIVS.
Dritter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XV. XVI. CIMEX *quatuor antennarum articulis* PRIMVS.
XVII. Erste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABULA XI.



G. P. Faustner sc.

TABULA XII.

Fig. III.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



TABVLA XII.

Z w ö l f t e T a f e l.



- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. IV. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. V. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. VI. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. IX. LIBELLVLA alis *erectis* PRIMA.
Erstes Jüngerchen mit *aufgerichteten* Flügeln.
- Fig. X. NEMOTELVS PRIMVS.
Erste Stiletfliege.
- Fig. XI. NEMOTELVS SECUNDVS.
Zweyte Stiletfliege.
- Fig. XIII. NEMOTELVS TERTIVS.
Dritte Stiletfliege.

TABVLA XIII.


Dreyzehende Tafel.

- Fig. I. *CIMEX quatuor antennarum articulis secundys.*
Zweyte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. II. *CIMEX quatuor antennarum articulis tertivs.*
Dritte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. III. *CIMEX quatuor antennarum articulis quartvs.*
Vierte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *CIMEX quatuor antennarum articulis quintvs.*
Fünfte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. *CIMEX quatuor antennarum articulis sextvs.*
Sechste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. VII. *CIMEX quatuor antennarum articulis septimvs.*
Siebende wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. *CIMEX quatuor antennarum articulis octavvs.*
Achte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. *CIMEX quatuor antennarum articulis nonvs.*
Neunte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *CIMEX quatuor antennarum articulis decimvs.*
Zehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. *CIMEX quatuor antennarum articulis vndecimvs.*
Eilfte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *CIMEX quatuor antennarum articulis duodecimvs.*
Zwölfte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABULA XIII.



TABULA XIV.



G. P. T. auct. de Nor.

TABVLA XIV.

Vierzehende Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis caudatis PRIMVS.*
Erfter Tagfalter mit gefchwänzten Flügeln.

Fig. III. IV. *ONISCVS PRIMVS.*
Erſte Affel.

Fig. V. VI. *ONISCVS SECVNDVS.*
Zweyte Affel.

Fig. VII. *CERAMBYX QVARTVS.*
Vierter Holzkäfer.

Fig. VIII. *CERAMBYX QVINTVS.*
Fünfter Holzkäfer.

Fig. IX. *CERAMBYX SEXTVS.*
Sechster Holzkäfer.

Fig. X. *STRATIOMYS PRIMA.*
Erſte Waffenfliege.

Fig. XI. *STRATIOMYS SECVNDA.*
Zweyte Waffenfliege.

Fig. XII. XIII. *STRATIOMIS TERTIA.*
Dritte Waffenfliege.


Fig. XIV. *STRATIOMYS QVARTA.*
Vierte Waffenfliege.

Fig. XV. *STRATIOMYS QVINTA.*
Fünfte Waffenfliege.

TABVLA XV. Funfzehende Tafel.

- Fig. I. II. BIBIO PRIMVS.
Erſte Marcusfliege.
- Fig. III. TIPVLA alis patentibus PRIMA. MAS.
Erſte Erdfliege mit offenen Flügeln. Männchen.
- Fig. IV. TIPVLA alis patentibus SECUNDA. FEMINA.
Zweyte Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. V. TIPVLA alis patentibus TERTIA.
Dritte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. VI. TIPVLA alis patentibus QUARTA.
Vierte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. VII. TIPVLA alis patentibus QUINTA.
Fünfte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. VIII. TIPVLA alis patentibus SEXTA.
Sechste Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. IX. TIPVLA alis patentibus SEPTIMA.
Siebende Erdfliege mit offenen Flügeln.

TABULA XV.



G. P. Trinitas et A. V. 1806.

TABVLA XVI.

Sechzehende Tafel.

- Fig. I. SPHINX alis integris cauda pilosa f. barbosa PRIMA.
Erster Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem oder bärtigem Schwanze.
- Fig. II. III. SPHINX alis integris cauda pilosa SECUNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanze.
- Fig. IV. V. SPHINX alis integris cauda simplici SECUNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VI. VII. SPHINX alis integris cauda simplici TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VIII. TELEPHORVS oblongus PRIMVS.
Erster länglicher Warzenkäfer.
- Fig. IX. TELEPHORVS oblongus SECUNDVS.
Zweyter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. X. TELEPHORVS oblongus TERTIVS.
Dritter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XI. TELEPHORVS oblongus QVARTVS.
Vierter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XII. TELEPHORVS oblongus QVINTVS.
Fünfter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XIII. TELEPHORVS oblongus SEXTVS.
Sechster länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XIV. TELEPHORVS oblongus SEPTIMVS.
Siebender länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XV. TELEPHORVS oblongus OCTAVVS.
Achter länglicher Warzenkäfer.

TABVLA XVII.

Siebenzehende Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *pellinicornis* alis *patentibus* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. II. PHALAENA *pellinicornis* alis *patentibus* SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* QUINTA.
Fünfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum truncata* PRIMA.
Erste Hausfliege mit abgestutztem Spadel.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum truncata* SECUNDA.
Zweyte Hausfliege mit abgestutztem Spadel.
- Fig. VI. ASILVS SEXTVS.
Sechste Raubfliege.
- Fig. VII. ASILVS SEPTIMVS.
Siebende Raubfliege.
- Fig. VIII. IX. MVSCA *spathula antennarum rotunda* PRIMA.
Erste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA XVIII.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. XIV.



Fig. XIII.



J.P. Fendler sc. Nov.

TABVLA XVIII.

Achtzehende Tafel.


- Fig. I. CARABVS *oblongus* QVINTVS.
Fünfter länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. CARABVS *oblongus* SEXTVS.
Sechster länglicher Laufkäfer.
- Fig. III. CARABVS *oblongus* SEPTIMVS.
Siebender länglicher Laufkäfer.
- Fig. IV. CARABVS *oblongus* OCTAVVS.
Achter länglicher Laufkäfer.
- Fig. V. CARABVS *oblongus* NONVS.
Neunter länglicher Laufkäfer.
- Fig. VI. CARABVS *oblongus* DECIMVS.
Zehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. VII. CARABVS *oblongus* VNDECIMVS.
Eilfter länglicher Laufkäfer.
- Fig. VIII. CARABVS *onatus* QVARTVS.
Vierter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. IX. CARABVS *oblongus* DVODECIMVS.
Zwölfter länglicher Laufkäfer.
- Fig. X. XI. TELEPHORVS *onatus* PRIMVS.
Erster eyrunder Warzenkäfer.
- Fig. XII. XIII. TELEPHORVS *onatus* SECVNDVS.
Zweyter eyrunder Warzenkäfer.
- Fig. XIV. TELEPHORVS *onatus* TERTIVS.
Dritter eyrunder Warzenkäfer.

TABULA XIX.

Neunzehende Tafel.

- Fig. I. ELATER antennis *ferratis* QUINTVS.
Fünfter Springkäfer mit *fögförmigen* Föhlhörnern.
- Fig. II. ELATER antennis *setaceis* PRIMVS.
Erfter Springkäfer mit *borftigen* Föhlhörnern.
- Fig. III. ELATER antennis *ferratis* SEXTVS.
Sechfter Springkäfer mit *fögförmigen* Föhlhörnern.
- Fig. IV. ELATER antennis *ferratis* SEPTIMVS.
Siebender Springkäfer mit *fögförmigen* Föhlhörnern.
- Fig. V. ELATER antennis *setaceis* SECUNDVS.
Zweyter Springkäfer mit *borftigen* Föhlhörnern.
- Fig. VI. ELATER antennis *setaceis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit *borftigen* Föhlhörnern.
- Fig. VII. ELATER antennis *setaceis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit *borftigen* Föhlhörnern.
- Fig. VIII. ARANEA oculorum fitu *semilunato* PRIMA.
Erfte Spinne mit Augen im *halben Monde*.
- Fig. IX. ARANEA oculorum fitu *quadrato* PRIMA.
Erfte Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. X. ARANEA oculorum fitu *quadrato* SECUNDA.
Zweyte Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. XI. ARANEA oculorum fitu *quadrato* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. XII. ARANEA oculorum fitu *quadrato* QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. XIII. ARANEA oculorum fitu *semilunato* SECUNDA.
Zweyte Spinne mit Augen im *halben Monde*.
- Fig. XIV. XV. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QUINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *borftigen* Föhlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. XVI. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* PRIMA.
Erfter Nachtfalter mit *borftigen* Föhlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

TABULA XIX.



Sc. naturae a. 1772.

TABULA XX.



Fig. I.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. XII.



Sc. Trindor. et Nig.

Tabula XX.

Zwanzigste Tafel.





- Fig. I. STAPYLINVS TERTIVS.
Dritter Raubkäfer.
- Fig. II. ICHNEVMON SEXTVS.
Sechste Schlupfwespe.
- Fig. IV. V. ICHNEVMON SEPTIMVS.
Siebende Schlupfwespe.
- Fig. VI. ICHNEVMON OCTAVVS.
Achte Schlupfwespe.
- Fig. VII. ICHNEVMON NONVS.
Neunte Schlupfwespe.
- Fig. VIII. ICHNEVMON DECIMVS.
Zehende Schlupfwespe.
- Fig. IX. ICHNEVMON VNDECIMVS.
Elfte Schlupfwespe.
- Fig. X. ICHNEVMON DVODECIMVS.
Zwölfte Schlupfwespe.
- Fig. XI. ICHNEVMON DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Schlupfwespe.
- Fig. XII. ICHNEVMON DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Schlupfwespe.
- Fig. XIII. ICHNEVMON DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehende Schlupfwespe.
- Fig. XIV. ICHNEVMON DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Schlupfwespe.

TABVLA XXI.

Ein und zwanzigste Tafel.



- | | |
|-------------|--|
| Fig. I. II. | CHRYSOMELA TERTIA.
<i>Dritter Blattkäfer.</i> |
| Fig. III. | CHRYSOMELA QVARTA.
<i>Vierter Blattkäfer.</i> |
| Fig. IV. | CHRYSOMELA QVINTA.
<i>Fünfter Blattkäfer.</i> |
| Fig. V. | CHRYSOMELA SEXTA.
<i>Sechster Blattkäfer.</i> |
| Fig. VI. | CHRYSOMELA SEPTIMA.
<i>Siebender Blattkäfer.</i> |
| Fig. VII. | CHRYSOMELA OCTAVA.
<i>Achter Blattkäfer.</i> |
| Fig. VIII. | CHRYSOMELA NONA.
<i>Neunter Blattkäfer.</i> |
| Fig. IX. | CHRYSOMELA DECIMA.
<i>Zehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. X. | CHRYSOMELA VNDECIMA.
<i>Elfter Blattkäfer.</i> |
| Fig. XI. | CHRYSOMELA DVODECIMA.
<i>Zwölfter Blattkäfer.</i> |
| Fig. XII. | CHRYSOMELA DECIMA TERTIA.
<i>Dreizehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XIII. | CHRYSOMELA DECIMA QVARTA.
<i>Vierzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XIV. | CHRYSOMELA DECIMA QVINTA.
<i>Fünfzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XV. | CHRYSOMELA DECIMA SEXTA.
<i>Sechzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XVI. | CHRYSOMELA DECIMA SEPTIMA.
<i>Siebenzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XVII. | CHRYSOMELA DECIMA OCTAVA.
<i>Achtzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XVIII. | CHRYSOMELA DECIMA NONA.
<i>Neunzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XIX. | CHRYSOMELA VICESIMA.
<i>Zwanzigster Blattkäfer.</i> |
| Fig. XX. | CHRYSOMELA VICESIMA PRIMA.
<i>Ein und zwanzigster Blattkäfer.</i> |

TABVLA XXI.



J. D. Sauter sculp.

TABULA XXII.



Ad. W. H. H. H.

TABVLA XXIII.

Drey und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TERTIVS.
Dritter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis PRIMVS.
Erster Maulwurfskäfer mit siebenfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis QVARTVS.
Vierter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis QVINTVS.
Fünfter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SEXTVS.
Sechster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SEPTIMVS.
Siebender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis OCTAVVS.
Achter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis NONVS.
Neunter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS.
Zehender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.

TABVLA XXIII.

Drey und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TERTIVS.
Dritter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis PRIMVS.
Erfter Maulwurfskäfer mit siebenfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis QVARTVS.
Vierter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis QVINTVS.
Fünfter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SEXTVS.
Sechster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SEPTIMVS.
Siebender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis OCTAVVS.
Achter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis NONVS.
Neunter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS.
Zehender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.

TABULA XXIV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. XI.



S. V. A. 1793. 1794.

TABULA XXIV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. XI.



S. F. M. & J. R. & C.

TABVLA XXIV.

Vier und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. *TELEPHORVS oblongus* NONVS.
Neunter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. II. *VESPA PRIMA.*
Erste Wespe.
- Fig. III. *VESPA SECUNDA.*
Zweite Wespe.
- Fig. IV. *VESPA TERTIA.*
Dritte Wespe.
- Fig. V. *VESPA QUARTA.*
Vierte Wespe.
- Fig. VI. VII. *PHALAENA seticornis alis deflexis* SECUNDA.
Zweiter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VIII. IX. *PHALAENA peñicornis alis deflexis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. X. XI. *PHALAENA seticornis alis planis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA XXV.

Fünf und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus *dentatis* TERTIVS.
Dritter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. II. CVRCVLIO femoribus *dentatis* QVARTVS.
Vierter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. III. CVRCVLIO femoribus *muticis* TERTIVS.
Dritter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. IV. CVRCVLIO femoribus *muticis* QVARTVS.
Vierter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. V. CVRCVLIO femoribus *dentatis* QVINTVS.
Fünfter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* QVINTVS.
Fünfter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VII. CVRCVLIO femoribus *muticis* SEXTVS.
Sechster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VIII. CVRCVLIO femoribus *dentatis* SEXTVS.
Sechster Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. IX. CVRCVLIO femoribus *muticis* SEPTIMVS.
Siebender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. X. CVRCVLIO femoribus *muticis* OCTAVVS.
Achter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABULA XXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



I. G. Fiedrich sc. Renss.

TABULA XXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Sc. Manf. Lat.

TABVLA XXVI.

Sechs und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis VNDECIMVS.*
Eilfter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis DVODECIMVS.*
Zwölfter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis DECIMVS TERTIVS.*
Dreyzehender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis DECIMVS QVARTVS.*
Vierzehender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis DECIMVS QVINTVS.*
Fünfzehender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis DECIMVS SEXTVS.*
Sechzehender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis DECIMVS SEPTIMVS.*
Siebenzehender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis DECIMVS OCTAVVS.*
Achtzehender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis DECIMVS NONVS.*
Neunzehender Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.

TABVLA XXVII.

Sieben und zwanzigste Tafel.

Fig. I. a. b. ACARVS PRIMVS.
Erste Milbe.

Fig. II. a. b. ACARVS SECUNDVS.
Zweyte Milbe.

Fig. III. a. b. c. ACARVS TERTIVS.
Dritte Milbe.

Fig. IV. a. b. CASSIDA PRIMA.
Erster Schildkäfer.

Fig. V. CASSIDA SECUNDA.
Zweyter Schildkäfer.

Fig. VI. VII. ACRIDIVM PRIMVM.
Erste Schnarrheuschrecke.

Fig. VIII. IX. ACRIDIVM SECUNDVM.
Zweyte Schnarrheuschrecke.

Fig. X. XI. ACRIDIVM TERTIVM.
Dritte Schnarrheuschrecke.

TABULA XXVII.



I. G. Froben. sc. Ratisb.

TABULA XXVIII.

Fig. V.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII.



J. P. Macgill & Co. Lith.

TABVLA XXVIII.

Acht und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *peñicornis* alis *deflexis* SECUNDA.
Zweiter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

Fig. III. IV. PHALAENA *peñicornis* alis *planis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA *peñicornis* alis *deflexis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Tabula XXIX.

Neun und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA seticornis alis planis OCTAVA.*
Achter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus alis ocellatis PRIMVS.*
Erster sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.
- Fig. V. VI. *PAPILIO hexapus alis caudatis SECVNDVS.*
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.
- Fig. VII. VIII. *PHALAENA pectinicornis alis deflexis QVARTA.*
Vierter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IX. X. *PHALAENA seticornis alis conuolutis PRIMA.*
Erster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammen gerollten Flügeln.

TABULA XXIX.

Fig. III.



Fig. I.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. X.



TABULA XXX

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. XIII.



Fig. XIV.



Fig. XV.



Fig. XVI.



Fig. XVII.



I G. Fiedrich sc. Rat.

TABVLA XXX.

Dreyfsigfte Tafel.


- Fig. I. CRYPTOCEPHALVS PRIMVS.
Erfter Fallkäfer
- Fig. II. CRYPTOCEPHALVS SECVNDVS.
Zweyter Fallkäfer.
- Fig. III. CRYPTOCEPHALVS TERTIVS.
Dritter Fallkäfer.
- Fig. IV. CRYPTOCEPHALVS QVARTVS.
Vierter Fallkäfer.
- Fig. V. CRYPTOCEPHALVS QVINTVS.
Fünfter Fallkäfer.
- Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS SEXTVS.
Sechster Fallkäfer.
- Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS SEPTIMVS.
Siebender Fallkäfer.
- Fig. VIII. CRYPTOCEPHALVS OCTAVVS.
Achter Fallkäfer.
- Fig. IX. COCCINELLA OCTAVA.
Achter Blattlauskäfer.
- Fig. X. COCCINELLA NONA.
Neunter Blattlauskäfer.
- Fig. XI. COCCINELLA DECIMA.
Zehender Blattlauskäfer.
- Fig. XII. COCCINELLA VNDECIMA.
Eilfter Blattlauskäfer.
- Fig. XIII. COCCINELLA DVODECIMA.
Zwölfter Blattlauskäfer.
- Fig. XIV. COCCINELLA DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Blattlauskäfer.
- Fig. XV. COCCINELLA DECIMA QVARTA.
Vierzehender Blattlauskäfer.
- Fig. XVI. COCCINELLA DECIMA QVINTA.
Fünfzehender Blattlauskäfer.
- Fig. XVII. COCCINELLA DECIMA SEXTA.
Sechzehender Blattlauskäfer.

TABVLA XXXI.

Ein und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. ELATER *antennis ferratis* OCTAVVS.
Achter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. II. ELATER *antennis ferratis* NONVS.
Neunter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. III. ELATER *antennis ferratis* DECIMVS.
Zehender Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. ELATER *antennis pectinatis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. V. ELATER *antennis setaceis* QVINTVS.
Fünfter Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. ELATER *antennis ferratis* VNDECIMVS.
Elfster Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. ELATER *antennis setaceis* SEXTVS.
Sechster Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA *seticornis* *alis deflexis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis* *alis deflexis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. XII. BVPRESTIS SECVNDA.
Zweyter Stinkkäfer.
- Fig. XIII. CARABVS *ocatus* QVINTVS.
Fünfter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XIV. ARANEA *oculorum situ semilunato* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen im halben Monde.


TABULA XXXI.



S. L. P. R.

Æ. I. & Haas sc. Ratubona

TABULA XXXII.



TABVLA XXXII.

Zwey und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. *TIPVLA alis patentibus OCTAVA.*
Achte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. II. *APIS NONA.*
Neunte Biene.
- Fig. III. *APIS DECIMA.*
Zehende Biene.
- Fig. IV. *APIS VNDECIMA.*
Eilfte Biene.
- Fig. V. *APIS DVODECIMA.*
Zwölfte Biene.
- Fig. VI, VII, VIII. *APIS DECIMA TERTIA.*
Dreyzehende Biene.
- Fig. IX, X. *APIS DECIMA QVARTA.*
Vierzehende Biene.
- Fig. XI, XII. *APIS DECIMA QVINTA.*
Fünfzehende Biene.
- Fig. XIII. *APIS DECIMA SEXTA.*
Sechzehende Biene.
- Fig. XIV. *APIS DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehende Biene.
- Fig. XV. *APIS DECIMA OCTAVA.*
Achtzehende Biene.
- Fig. XVI, XVII. *APIS DECIMA NONA.*
Neunzehende Biene.
- Fig. XVIII. *APIS VICESIMA.*
Zwanzigste Biene.
- Fig. XIX. *APIS VICESIMA PRIMA.*
Ein und zwanzigste Biene.
- Fig. XX. *ARANEA oculorum situ trium linearum PRIMA.*
Erste Spinne mit Augen in drey Reihen.

TABVLA XXXIII.

Drey und dreyßsigste Tafel.

Fig. I. II. **HYDROPHILVS PRIMVS.**
Erfter Wafferkäfer.

Fig. III. IV. **NAVCORIS PRIMVS.**
Erfte Afterwanze.

Fig. V. VI. **NOTONECTA PRIMA.**
Erste Wafferwanze.


Fig. VII. VIII. **HEPA SECVNDA.**
IX. *Zweyter Wafferfcorpion.*

Fig. X. **HYDROPHILVS SECVNDVS.**
Zweyter Wafferkäfer.

TABVLA XXXIII.



TABVLA XXXIV.



Leibel p R

Sc. I. Maag v. Katschona.

TABVLA XXXIV.

Vier und dreyßsigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus muticis NONVS.
Neunter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS.
Zehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. III. CVRCVLIO femoribus muticis VNDECIMVS.
Eilfter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. IV. CRIOCERIS TERTIA.
Dritter Lilienkäfer.
- Fig. V. LEPTVRA thorace plano TERTIA.
Dritter Aetherholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VI. VII. PAPILIO hexapus alis integris PRIMVS.
Erster sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. VIII. CICINDELA SECVNDA.
Zweyter Zangenkäfer.
- Fig. IX. CICINDELA TERTIA.
Dritter Zangenkäfer.
- Fig. X. APIS VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigste Biene.
- Fig. XI. APIS VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigste Biene.
- Fig. XII. STENOCORVS thorace inermi QVARTVS.
Vierter Stutzkäfer mit flachellosem Brustschilde.

TABVLA XXXV.

Fünf und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. III. *PAPILIO hexapus alis angulatis PRIMVS.*
Erster sechsfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. IV. *VESPA QVINTA.*
Fünfte Wespe.

Fig. V. *VESPA SEXTA.*
Sechste Wespe.

Fig. VI. *BVPRESTIS TERTIA.*
Dritter Stinkkäfer.


Fig. VII. *BVPRESTIS QVARTA.*
Vierter Stinkkäfer.

Fig. VIII. *ARANEA oculorum situ semilunato QVARTA.*
Vierte Spinne mit Augen im halben Monde.

Fig. IX. *STAPHYLINVS QVARTVS.*
Vierter Raubkäfer.

Fig. X. *CICINDELA QVARTA.*
Vierter Zangenkäfer.

TABVLA XXXVI.



TABVLA XXXVI.

Sechs und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. CASSIDA TERTIA.
Dritter Schildkäfer.
- Fig. III. STOMOXOIDES PRIMVS.
Erste Taschenmefferfliege.
- Fig. IV. V. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* SECYNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.
- Fig. VI. STAPHYLINVS QVINTVS.
Fünfter Raubkäfer.
- Fig. VII. VIII. VOLVCELLA SEXTA.
Sechste Federbuschfliege.
- Fig. IX. X. MVSCA *spathula antennarum oblonga* PRIMA.
Erste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. XI. XII. MVSCA *spathula antenrarum rotunda* SECYNDIA.
Zweyte Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. XIII. MELOLONTHA QVINTA.
Fünfter Sägenblattkäfer.
- Fig. XIV. MELOLONTHA SEXTA.
Sechster Sägenblattkäfer.

TABVLA XXXVII.

Sieben und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. **GRYLLVS PRIMVS.**
Erste Grille.
- Fig. II, III. **PERLA PRIMA.**
Erste Aterfrühlingsfliege.
- Fig. IV, V. **PERLA SECUNDA.**
Zweyte Aterfrühlingsfliege.
- Fig. VI. **TENEBRIO antennarum articulis lentiformibus PRIMVS.**
Erster Mehlkäfer mit linsenförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII, VIII. **PHALAENA feticornis alis deflexis QUARTA.**
Vierter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IX, X. **PHRYGANEA SECUNDA.**
Zweyte Frühlingsfliege.
- Fig. XI. **ARANEA oculorum seu semilunato QUINTA.**
Fünfte Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. XII. **MUSCA spatula antennarum oblonga SECUNDA.**
Zweyte Hausfliege mit länglichen Spädel.
- Fig. XIII. **RHINOMACER SECUNDVS.**
Zweyter Aterrüffelkäfer.

TABULA XXXVIII.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.




Fig. XIII.



L. Del. p. R

TABULA XXXVIII.



S. L. p. R.

IN. Maag. j. c. Ratulona

TABVLA XXXVIII.

Acht und dreyßigste Tafel.


- Fig. I. ICHNEVMON DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzebeude Schlupfwespe.
- Fig. II. ELATER *antennis pectinatis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. III. CARABVS *oblongus* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. IV. LEPTVRA *thorace cylindraceo* PRIMA.
Erfter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. LEPTVRA *thorace cylindraceo* SECVNDA.
Zweyter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. VI. LEPTVRA *thorace globoso* SEXTA.
Sechster Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. VII. LEPTVRA *thorace globoso* SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. VIII. LEPTVRA *thorace globoso* OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IX. LEPTVRA *thorace globoso* NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis alis deflexis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Tabula XXXIX.

Neun und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace cylindraceo TERTIA.
Dritter Aferholzkäfer mit walzenähnlichem Brufthilde.
- Fig. II. LEPTVRA thorace conico PRIMA.
Erfter Aferholzkäfer mit kegelförmlichem Brufthilde.
- Fig. III. LEPTVRA thorace conico SECUNDA.
Zweyter Aferholzkäfer mit kegelförmlichem Brufthilde.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace conico TERTIA.
Dritter Aferholzkäfer mit kegelförmlichem Brufthilde.
- Fig. V. LEPTVRA thorace conico QUARTA.
Vierter Aferholzkäfer mit kegelförmlichem Brufthilde.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace conico QUINTA.
Fünfter Aferholzkäfer mit kegelförmlichem Brufthilde.
- Fig. VII. LEPTVRA thorace conico SEXTA.
Sechster Aferholzkäfer mit kegelförmlichem Brufthilde.
- Fig. VIII. LEPTVRA thorace conico SEPTIMA.
Siebender Aferholzkäfer mit kegelförmlichem Brufthilde.
- Fig. IX. LEPTVRA thorace conico OCTAVA.
Achter Aferholzkäfer mit kegelförmlichem Brufthilde.
- Fig. X. LEPTVRA thorace conico NONA.
Neunter Aferholzkäfer mit kegelförmlichem Brufthilde.
- Fig. XI. LEPTVRA thorace conico DECIMA.
Zehender Aferholzkäfer mit kegelförmlichem Brufthilde.
- Fig. XII. STAPHYLINUS SEXTUS.
Sechster Raubkäfer.

TABULA XXXIX.



TABULA XL.

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI



Fig. VI



Fig. VIII



Fig. IX



TABVLA XL.
Vierzigste Tafel.


- Fig. I. II. *MVSCA spatula antennarum oblonga* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus alis integris* SECVNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. V. VI. *CASSIDA* QVARTA.
Vierter Schildkäfer.
- Fig. VII. *PELTIS* PRIMA.
Erster Geißerkäfer.
- Fig. VIII. IX. *PAPILIO tetrapus alis angulatis* PRIMVS.
Erster vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

TABVLA XLI.

Ein und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. III. *CIMEX quinque antennarum articulis QUINTVS.*
Fünfte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. V. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS TERTIVS.*
Dreizehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. VII. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS QVARTVS.*
Vierzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. IX. *CIMEX quinque antennarum articulis SEXTVS.*
Sechste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. X. XI. *ICHNEVMON DECIMVS OCTAVVS.*
Achtzehende Schlupfwespe.
- Fig. XII. XIII. *FORFICVLA PRIMA.*
Erster Ohrkäfer.
- Fig. XIV. *CARABVS ouatus SEXTVS.*
Sechster eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XV. XVI. *TELEPHORVS ouatus QVARTVS.*
Vierter eyrunder Warzenkäfer.
- Fig. XVII. XVIII. *PHALAENA feticornis alis deflexis QVINTA.*
Fünfter Nachtfalter mit bogenstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.


TIBULA XLI



L. P. R.

I. G. Endrick & Rat

TABULA XLII.



Loubol F. R.

J. G. Lindbeck & Co. Rat.

TABVLA XLII.

Zwey und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *DERMESTES PRIMVS.*
Erfter Speckkäfer.
- Fig. III. *DERMESTES SECVNDVS.*
Zweyter Speckkäfer.
- Fig. IV. *DERMESTES TERTIVS.*
Dritter Speckkäfer.
- Fig. V. VI. *CHRYISIS PRIMA.*
Erfte Goldwespe.
- Fig. VII. *EPHEMERA SECVNDA.*
Zweyte Vferaaasfliege.
- Fig. VIII. IX. *TENTHREDO antennis setaceis TERTIA.*
Dritte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *ATTELABVS SECVNDVS.*
Zweyter Schildkrötenkäfer.
- Fig. XI. *CIMEX quinque antennarum articulis SEPTIMVS.*
Siebende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS QVINTVS.*
Fünfechende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XIII. *ARANEA oculorum situ semilunato SEXTA.*
Sechste Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA XLIII.

Drey und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. ICHNEVMON DECIMVS NONVS.
Neunzehende Schlupfwespe.
- Fig. III. IV. CIMEX *quinque* antennarum articulis OCTAVVS.
Achte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. VI. ICHNEVMON VICESIMVS.
Zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. VIII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. CVRCVLIO femoribus *muticis* DVODECIMVS.
Zwölfter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. X. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. XI. XII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. XIII. XIV. PHALAENA *peūicornis* alis *deflexis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. XV. XVI. CIMEX *quinque* antennarum articulis NONVS.
Neunte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABULA XLIV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.

Fig. VII.



Fig. VIII.

Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. X.



Leid. p. R

W. J. Van der Horst

TABVLA XLIY.

Vier und vierzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. CHRYSOMELA VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. III. APIS VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Biene.
- Fig. IV. V. PHRYGANEAE TERTIA.
Dritte Frühlingsfliege.
- Fig. VI. LIBELLVLA alis erectis SECVNDA.
Zweytes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VII. VIII. CRABRO TERTIVS.
Dritte Kolbenfliege.
- Fig. IX. X. PHALAENA peffinicornis alis deflexis SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. XI. ARANEA oculorum situ quatuor linearum PRIMA.
Erste Spinne mit Augen in vier Reihen.

TABVLA XLV.
Fünf und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis caudatis TERTIVS.*
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.
- Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus alis caudatis QVARTVS.*
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.
- Fig. V. *ELATER antennis pedinatis QVINTVS.*
Fünfter Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VI. *APIS VICESIMA QVINTA.*
Fünf und zwanzigste Biene.
- Fig. VII. *ICHNEVMON VICESIMVS PRIMVS.*
Ein und zwanzigste Schlupfwespe.



TABULA XLV.



Loebel p. R

Ch. A. M. Mag. et. Rot. et. et.

TABULA XLVI.



Label p. R.

L.N. Maag sc. Ratibona

TABVLA XLVI.

Sechs und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS.*
Zehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. III. *CIMEX quinque antennarum articulis VNDCEIMVS.*
Elfte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. V. *CIMEX quinque antennarum articulis DVODECIMVS.*
Zwölftte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS TERTIVS.*
Dreyzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. VIII. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS QVARTVS.*
Vierzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. *BOMBYLIVS PRIMVS.*
Erste Rüffelfliege.
- Fig. X. XI. *CARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS.*
Zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *SCOLOPENDRA PRIMA.*
Erster Vielfuß.

TABVLA XLVII.
Sieben und vierzigste Tafel.

- Fig. I. *CANTHARIS PRIMA.*
Erster Pflasterkäfer.
- Fig. II, III. *PHALAENA feticornis alis deflexis SEPTIMA.*
Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV, V. *CHRYSOMELA VICESIMA TERTIA.*
Drey und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. VI. *STRATIOMYS SEXTA.*
Sechste Waffenfliege.
- Fig. VII, VIII. *ARANEA oculorum situ semilunato SEPTIMA.*
Siebende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. IX, X. *ASILVS OCTAVVS.*
Achte Raubfliege.

TABULA XLII



Lobel p. R.

IN Maag sc. Rat.

TABVLA XLIX.

Neun und vierzigste Tafel.

- Fig. I. *BVPRESTIS* QVINTA.
Fünfter Stinkkäfer.
- Fig. II. III. *STOMOXOIDES* SECUNDVS.
Zweyte Taschenmesserfliege.
- Fig. IV. *ICHNEVMON* VICESIMVS SECVDVL.
Zwey und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. *ARANEA* oculorum situ semilunato OCTAVA.
Achte Spinne mit Augen im halben Monde,
- Fig. VI. *ARANEA* oculorum situ semilunato NONA.
Neunte Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. VII. *ARANEA* oculorum situ duarum linearum PRIMA.
Erste Spinne mit Augen in zwey Reihen.
- Fig. VIII. *ARANEA* oculorum situ duarum linearum SECVND.
Zweyte Spinne mit Augen in zwey Reihen.
- Fig. IX. *ARANEA* oculorum situ quatuor linearum SECVND.
Zweyte Spinne mit Augen in vier Reihen.

TABULA XLIX.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.




Fig. IX.



Fig. VIII.



TABULA L.



L. x. d. p. R.

IN. Maag. & Rat

TABVLA L.

Funfzigste Tafel.



- Fig. I. II. **LIBELLOIDES PRIMVS FEMINA.**
Erstes Aferjüngferchen. Weibgen.
- Fig. III. **LIBELLOIDES SECVNDVS. MAS.**
Zweytes Aferjüngferchen. Männchen.
- Fig. IV. **CVRCVLIO femoribus deutatis SEPTIMVS.**
Siebender Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. V. **ICHNEVMON VICESIMVS TERTIVS.**
Drey und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. **TENTREDO antennis setaceis QVARTA.**
Vierte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. **BVPRESTIS SEXTA.**
Sechster Stinkkäfer.
- Fig. VIII. **SCARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS PRIMVS.**
Ein und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. **SCARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS SECVNDVS.**
Zwey und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. X. **APIS VICESIMA SEXTA.**
Sechs und zwanzigste Biene.

TABVLA LI.


Ein und funfzigste Tafel.

- Fig. I. CARABVS *ollongus* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. ASILVS VNDECIMVS.
Eilfte Raubfliege.
- Fig. III. TENEBRIO antennarum articulis *clauatis* PRIMVS.
Erster Mehlkäfer mit käulenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. IV. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. MELOLONTHA SEPTIMA.
Siebender Sägenblattkäfer.
- Fig. VI. COCCINELLA DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Blattlauskäfer.
- Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. X. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. XI. XII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABULA LI.



TABULA LII.



Loubd. p. R.

G. P. Houtner sc. & del.

TABVLA LII.

Zwey und funfzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA *alis patentibus sexta.*
Sechstes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. VESPA *septima.*
Siebende Wespe.
- Fig. III. NEMOTELVS *quartus.*
Vierte Stiletfliege.
- Fig. IV. ICHNEVMON *vicesimus quartus.*
Vier und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. ICHNEVMON *vicesimus quintus.*
Fünf und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. APIS *vicesima septima.*
Sieben und zwanzigste Biene.
- Fig. VII. CANTHARIS *secunda.*
Zweiter Pflasterkäfer.
- Fig. VIII. LEPTVRA *thorace cylindraceo sexta.*
Sechster Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. IX. X. CRIOCERIS *quarta.*
Vierter Lilienkäfer.
- Fig. XI. XII. MELOLONTA *octava.*
Achter Sägeblattkäfer.
- Fig. XIII. MVSCA *(spatula antennarum rotunda tertia.)*
Dritte Hausfliege mit runder Spadel.
- Fig. XIV. ASILVS *duodecimvs.*
Zwölfte Raubfliege.

TABVLA LIII.

Drey und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. HIPPOBOSCA SECUNDA.
Zweyte Pferdfliege.
- Fig. III. NEMOTELVS QVINTVS.
Fünfte Stiletfliege.
- Fig. IV. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS TERTIVS.
Dreyundzwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. VESPA OCTAVA.
Achte Wespe.
- Fig. VI. RHINOMACER TERTIVS.
Dritter Asterrüsselkäfer.
- Fig. VII. BVPRESTIS SEPTIMA.
Siebender Stinkkäfer.
- Fig. VIII. CEROCOMA PRIMA. MAS.
Erster Kronenkäfer. Männchen.
- Fig. IX. CEROCOMA SECUNDA. FEMINA.
Zweyter Kronenkäfer. Weibgen.
- Fig. X. VESPA NONA.
Neunte Wespe.
- Fig. XI. APIS VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigste Biene.

TABULA LIII.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



TABVLA LV.

Fünf und funfzigste Tafel.

- | | |
|--------------------|---|
| Fig. I. | CERAMBYX SEPTIMVS.
<i>Siebender Holzkäfer.</i> |
| Fig. II. | CERAMBYX OCTAVVS.
<i>Achter Holzkäfer.</i> |
| Fig. III. | CERAMBYX NONVS.
<i>Neunter Holzkäfer.</i> |
| Fig. IV. | CERAMBYX DECIMVS.
<i>Zehender Holzkäfer.</i> |
| Fig. V. | CERAMBYX VNDECIMVS.
<i>Elfster Holzkäfer.</i> |
| Fig. VI. | LEPTVRA thorace cylindraco SEPTIMA.
<i>Siebender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.</i> |
| Fig. VII. | LEPTVRA thorace plano QVARTA.
<i>Vierter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.</i> |
| Fig. VIII. | LEPTVRA thorace globoso DECIMA.
<i>Zehender Afterholzkäfer mit kuglichem Brustschilde.</i> |
| Fig. IX. | LEPTVRA thorace cylindraco OCTAVA.
<i>Achter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.</i> |
| Fig. X. XI. | TENTHREDO antennis clauatis SEXTA.
<i>Sechste Sägfliege mit käuförmigen Fühlhörnern.</i> |
| Fig. XII.
XIII. | TENTHREDO antennis clauatis SEPTIMA.
<i>Siebende Sägfliege mit käuförmigen Fühlhörnern.</i> |

TABULA LV.

Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. XIII.



TABULA LVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Label p. R.

G. P. Trumbull sc. Nor.

TABVLA LVI.

Sechs und funfzigste Tafel.

- Fig. I. *TENTHREDO* *antennis pectinatis* *SECUNDA*.
Zweyte Sägflicge mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. II. *TENTHREDO* *antennis filiformibus* *TERTIA*.
Dritte Sägflicge mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. III. *TENTHREDO* *antennis filiformibus* *QUARTA*.
Vierte Sägflicge mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *RHINOMACER* *QUARTVS*.
Vierter Afterrüsselkäfer.
- Fig. V. VI. *RHINOMACER* *QVINTVS*.
Fünfter Afterrüsselkäfer.
- Fig. VII. *RHINOMACER* *SEXTVS*.
Sechster Afterrüsselkäfer.
- Fig. VIII. *RHINOMACER* *SEPTIMVS*.
Siebender Afterrüsselkäfer.
- Fig. IX. *RHINOMACER* *OCTAVVS*.
Achter Afterrüsselkäfer.
- Fig. X. *RHINOMACER* *NONVS*.
Neunter Afterrüsselkäfer.

TABVLA LVII.

Sieben und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS SEXTVS.*
Sechzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. III. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS SEPTIMVS.*
Siebenzehende Wanze mit funfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS OCTAVVS.*
Achtzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS NONVS.*
Neunzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS OCTAVVS.*
Achtzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. VIII. *CIMEX quinque antennarum articulis DECIMVS NONVS.*
Neunzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. *CIMEX quinque antennarum articulis VICESIMVS.*
Zwanzigste Wanze mit funfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *CIMEX quinque antennarum articulis VICESIMVS PRIMVS.*
Ein und zwanzigste Wanze mit funfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. *CIMEX quinque antennarum articulis VICESIMVS SECVNDVS.*
Zwey und zwanzigste Wanze mit funfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS.*
Zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABULA LVII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



TABVLA LIX.


Neun und funfzigfte Tafel.

- Fig. I. CANTHARIS QUARTA.
Vierter Pflasterkäfer.
- Fig. II. III. STRATIOMYS SEPTIMA.
Siebende Waffenfliege.
- Fig. IV. V. PHALAENA *pestinicornis* alis deflexis OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA QUARTA.
Vierzehender Aetherholzkäfer mit kegelförmlichem Brustschilde.
- Fig. VII. ARANEA *oculorum situ semilunato* DECIMA.
Zehende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis* alis convolutis SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

TABULA LIX.



TABULA LX.



Loubet p. R.

I. G. Frisch sc. Rat.

TABVLA LX.

Sechzigste Tafel.

- Fig. I. **LIBELLULA** alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebendes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. **CLERVS** SECUNDVS.
Zweyter Bienenkäfer.
- Fig. III. **TENEBRIO** antennarum articulis *lentiformibus* SECUNDVS.
Zweyter Mehlkäfer mit *linsenförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. **ICHNEVMON** VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. **CVRCVLIO** femoribus *muticis* DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehnder Rüsselkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.
- Fig. VI. VII. **PHALAENA** *pedunculata* alis *deflexis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *gekrümmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. VIII. IX. **PHALAENA** *feticornis* alis *deflexis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. X. **CIMEX** *quinque* antennarum articulis *vicesimvs* TERTIVS.
Drey und zwanzigste Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

TABVLA LXL

Ein und sechzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA peñinicornis alis deflexis DECIMA.*
Zehender Nachtfalter mit gekämmten Fühhörnern und abhängenden
Flügeln.
- Fig. III. *ICHNEVMON VICESIMVS SEPTIMVS.*
Sieben und zanzigste Schlupfwespe
- Fig. IV. *ICHNEVMON VICESIMVS OCTAVVS.*
Acht und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. *ICHNEVMON VICESIMVS NONVS.*
Neun und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. *ICHNEVMON TRICESIMVS.*
Dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. *ICHNEVMON TRICESIMVS PRIMVS.*
Ein und dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. VIII. *ICHNEVMON TRICESIMVS SECVNDVS.*
Zwey und dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. IX. *ICHNEVMON TRICESIMVS TERTIVS.*
Drey und dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. X. *ICHNEVMON TRICESIMVS QVARTVS.*
Vier und dreyßigste Schlupfwespe.

TABULA LXI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. X.



Lobd p. R

W. H. H. H. H.

TABULA LXII.



Fig. I.



Fig. III.




Fig. II.



Fig. IV.

Fig. VI.



Fig. V.




Fig. VII.



Fig. VIII.

Fig. X.



Fig. XI.



Fig. IX.



TABVLA LXII.

Zwey und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. *LOCVSTA PRIMA.*
Erste Heuschrecke.

Fig. III. IV. *LOCVSTA SECUNDA.*
Zweyte Heuschrecke.

Fig. V. *LOCVSTA TERTIA.*
Dritte Heuschrecke.

Fig. VI. *COCCINELLA DECIMA NONA.*
Neunzehender Blattlauskäfer.

Fig. VII. *MELOLONTHA NONA.*
Neunter Sägenblattkäfer.

Fig. VIII. IX. *TENTHREDO antennis setaceis QVINTA.*
Fünfte Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.

Fig. X. *CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS SEXTVS.*
Sechzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. XI. *CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS SEPTIMVS.*
Siebenzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA LXIII.

Drey und sechzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis vicesimus quartus.*
Vier und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. COPRIS *corniger primus.*
Erster gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. III. COPRIS *corniger secundus.*
Zweyter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. IV. COPRIS *corniger tertius.*
Dritter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. V. COPRIS *corniger quartus.*
Vierter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. VI. LEPTVRA *thorace plano quinta.*
Fünfter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VII. PLATYCERVUS *secundus.*
Zweyter Kammkäfer.
- Fig. VIII. PHALAENA *feticornis als patentibus septima.*
Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABULA LXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loibà p. R.

De la nature de R.

TABVLA LXIV.



Fig. VIII.



Labol' p. R.

I. G. Frobenius sc. Kar.

TABVLA LXIV.

Vier und sechzigste Tafel.


- Fig. I. II. **PHALAENA** *peñincornis* *alis deflexis* VNDECIMA.
 Elfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln
- Fig. III. **LEPTVRA** *thorace globoso* VNDECIMA.
 Elfter Aafterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IV. **LEPTVRA** *thorace plano* SEXTA.
 Sechster Aafterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. V. **LEPTVRA** *thorace plano* SEPTIMA.
 Siebender Aafterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VI. **LEPTVRA** *thorace plano* OCTAVA.
 Achter Aafterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VII. **LEPTVRA** *thorace plano* NONA.
 Neunter Aafterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VIII. **ARANEA** *oculorum situ quadrato* QUINTA.
 Fünfte Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA LXV.

Fünf und sechzigste Tafel.

- | | |
|------------|---|
| Fig. I. | CERAMBYX DVODECIMVS.
<i>Zwölfter Holzkäfer.</i> |
| Fig. II. | CRYPTOCEPHALVS NONVS.
<i>Neunter Fallkäfer.</i> |
| Fig. III. | CRYPTOCEPHALVS DECIMVS.
<i>Zehender Fallkäfer.</i> |
| Fig. IV. | CRYPTOCEPHALVS VNDECIMVS.
<i>Eilfter Fallkäfer.</i> |
| Fig. V. | CRYPTOCEPHALVS DVODECIMVS.
<i>Zwölfter Fallkäfer.</i> |
| Fig. VI. | CRYPTOCEPHALVS DECIMVS TERTIVS.
<i>Dreyzehender Fallkäfer.</i> |
| Fig. VII. | CHRYSOMELA VICESIMA QVINTA.
<i>Fünf und zwanzigster Blattkäfer.</i> |
| Fig. VIII. | CHRYSOMELA VICESIMA SEXTA.
<i>Sechs und zwanzigster Blattkäfer.</i> |
| Fig. IX. | CHRYSOMELA VICESIMA SEPTIMA.
<i>Sieben und zwanzigster Blattkäfer.</i> |
| Fig. X. | CHRYSOMELA VICESIMA OCTAVA.
<i>Acht und zwanzigster Blattkäfer.</i> |
| Fig. XI. | LEPTVRA thorace conico DECIMA QVINTA.
<i>Fünfzehender Aetherholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.</i> |

TABULA LXV



Tabul. F. R.

J. G. Tiedemann sc. Rot.

TABULA LXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Loud. p. R.

J. V. Maag & Co.

Tabula LXVI

Sechs und sechzigste Tafel.


- Fig. I.** *TENEBRIO antennarum articulis lentiformibus* LEPTIVS.
Dritter Mehlkäfer mit linsenförmigen Fühlhörnern.
- Fig. II. III.** *PHALAENA pectinicornis alis deflexis* DODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV.** *SCARABAEVS tribus antennarum lamellis* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V.** *SCARABAEVS tribus antennarum lamellis* VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VI.** *CARABVS onatus* SEPTIMVS.
siebender eyrunder Laufkäfer.
- Fig. VII.** *CARABVS onatus* OCTAVVS.
Achter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. VIII.** *PHALAENA feticornis alis deflexis* UNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA LXVII.

Sieben und sechzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *planis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit vorstigen Fühlhörnern und flachem Brustschilde.
- Fig. III. PRIONVS SECUNDVS.
Zweyter Sägenholzkäfer.
- Fig. IV. BVPRESTIS OCTAVA.
Achter Stinkkäfer.
- Fig. V. BVPRERTIS NONA.
Neunter Stinkkäfer.
- Fig. VI. BVPRESTIS DECIMA.
Zehender Stinkkäfer.
- Fig. VII. BVPRESTIS VNDECIMA.
Eilfter Stinkkäfer.
- Fig. VIII. BVPRESTIS DVODECIMA.
Zwölfter Stinkkäfer.
- Fig. IX. BVPRESTIS DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Stinkkäfer.
- Fig. X. XI. PHALAENA *peñinicornis* alis *deflexis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABULA LXVII.



Lodol p. R.

Ch. L. Haggard & Co. & Co.

TABULA LXVIII




Fig. R

Fig. S

TABVLA LXVIII.

Acht und sechzigste Tafel.

- Fig. I. *LEPTVRA thorace plano* DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.
- Fig. II. III. *PHALAENA peñinicornis alis planis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. IV. V. *PHALAENA peñinicornis alis planis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. VI. *MVSCA spatula antennarum rotunda* SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. VII. VIII. *TENTHREDO antennis peñinatis* TERTIA.
Dritte Sägfliede mit *gekämmten* Fühlhörnern.
- Fig. IX. *TENTHREDO antennis clauatis* OCTAVA.
Achte Sägfliede mit *käuförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. X. *TENTHREDO antennis clauatis* NONA.
Neunte Sägfliede mit *käuförmigen* Fühlhörnern.

TABVLA LXIX.

Neun und sechzigste Tafel.

- Fig. I. *LEPTVRA thorace plano vndecima.*
Elfter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. II. III. *PHALAENA peñinicornis alis deflexis decima quarta.*
Viersehender Nachtfalter mit gekümmten Fühlhörnern und abhange-
den Flügeln.
- Fig. IV. V. *SPHINX alis integris cauda simplici quarta.*
Vierter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanz.
- Fig. VI. *PHALAENA peñinicornis alis patentibus quinta.*
Fünfter Nachtfalter mit gekümmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VII. *APIS vicesima nona.*
Neun und zwanzigste Biene.
- Fig. VIII. *APIS tricesima.*
Dreysigste Biene.
- Fig. IX. *APIS tricesima prima.*
Ein und dreysigste Biene.

TABULA LXIX.



Fig. IX.



TABVLA LXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Lothol p. Rat.

I. G. Fiedrich sc. Rat.

TABVLA LXX.
Siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis angulatis secundus.*
Zweyter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. IV. *VESPA decima.*
V. Lebende Wespe.

Fig. VI. *ICHNEVMON tricesimus quintus.*
Fünf und dreyßigste Schlupfwespe.

Fig. VII. VIII. *TENTHREDO antennis pedunculatis quarta.*
Vierte Sägfliede mit gekämmten Fühlhörnern.

TABVLA LXXI.

Ein und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. SPHINX *alis integris cauda simplici* QUINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. II. VESPA VNDECIMA.
Eilfte Wespe.
- Fig. III. STAPHYLINVS SEPTIMVS.
Siebender Raubkäfer.
- Fig. IV. V. PHALAENA *pedunculata alis deflexis* DECIMA QUINTA.
Fünfzehnder Nachtfalter mit gekämmten Fühhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. MVSCA *spatula antennarum rotunda* OCTAVA.
Achte Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VII. TENTHREDO *antennis clauatis* DECIMA.
Zehende Sägfliede mit käulformigen Fühhörnern.
- Fig. VIII. ARANEA *oculorum situ semilunato* VNDECIMA.
Eilfte Spinne mit Augen im halben Monde.

TABULA LXXI




Fig. VIII.



Lonbel p. R.

J. G. Frobenius sc. R. et.

TABVLA LXXII.



Verbeke p. R.

Ch. K. Haas & Co. N. Y.

TABVLA LXXII.

Zwey und fiebenzigfte Tafel.


- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* *alis deflexis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borftigen* Fühlhörnern und *fachen* Flügeln.
- Fig. III. STENOCORVS *thorace inermi* QUINTVS.
Fünfter Stutzkäfer mit *flachellofem* Brutfchilde.
- Fig. IV. ICHNEVMON *tricesimus sextus*.
Sechs und dreyßigfte Schlupfwefpe.
- Fig. V. ICHNEVMON *tricesimus septimus*.
Sieben und dreyßigfte Schlupfwefpe.
- Fig. VI. TABANVS *tertius*.
Dritte Bremsenfliege.

TABVLA LXXIII.


Drey und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. **ICHNEVMON** TRICESIMVS OCTAVVS.
Acht und dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. II. **COPRIS** *corniger* QVINTVS.
Fünfter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. III. **COPRIS** *corniger* SEXTVS.
Sechster gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. IV. **COPRIS** *corniger* SEPTIMVS.
Siebender gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. V. **COPRIS** *corniger* OCTAVVS.
Achter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. VI. **COPRIS** *muticus* TERTIVS.
Dritter ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. VII. **MVSCA** *spathula antennarum rotunda* NONA.
Neunte Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VIII. **MVSCA** *spathula antennarum fusiformi* PRIMA.
Erste Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.
- Fig. IX. **ICHNEVMON** TRICESIMVS NONVS.
Neun und dreyßigste Schlupfwespe.

TABULA LXXIII.



TABULA LXXIV.



Leidel p. R.

Sc. et. H. n. g. et. v. a. p.

TABVLA LXXIV.

Vier und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. **FORMICALEO** *secvndvs.*
Zweyter Ameisenlöwe.
- Fig. III. **SCARABAEVS** *tribus antennarum lamellis vicesimvs septimvs.*
Sieben und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühl-
hörnern.
- Fig. IV. **ICHNEVMON** *qvadragesimvs.*
Vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. **VESPA** *dvodecima.*
Zwölftwefpe.
- Fig. VI. **SCARABAEVS** *tribus antennarum lamellis vicesimvs octavvs.*
Acht und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühl-
hörnern.
- Fig. VII. VIII. **CHRYSIS** *secvnda.*
Zweyte Goldwespe.

TABVLA LXXV.

Fünf und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris* TERTIVS.
Dritter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. *PELTIS SECUNDA.*
Zweiter Geißerkäfer.

Fig. IV. *PELTIS TERTIA.*
Dritter Geißerkäfer.

Fig. V. *PELTIS QUARTA.*
Vierter Geißerkäfer.

Fig. VI. *PELTIS QUINTA.*
Fünfter Geißerkäfer.

Fig. VII. *PLATYCERVS TERTIVS.*
Dritter Kammkäfer.

Fig. VIII. *RHINOMACER DECIMVS.*
Zehender Afterrüsselkäfer.

TAFEL VI.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.

Fig. VII.



Fig. VIII.

TABULA LXXVI

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Loubet p. R

De Me Maag re. Rat

TABVLA LXXVI.

Sechs und siebenzigste Tafel.



- Fig. I. RHINOMACER VNDECIMVS.
Eilfter Afterrüffelkäfer.
- Fig. II. RHINOMACER DVODECIMVS.
Zwölfter Afterrüffelkäfer.
- Fig. III. RHINOMACER DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Afterrüffelkäfer.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *planis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit borftigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. NEMOTELVS sextvs.
Sechste Stiletfliege.
- Fig. VII. NEMOTELVS SEPTIMVS.
Siebende Stiletfliege.
- Fig. VIII. NEMOTELVS OCTAVVS.
Achte Stiletfliege.
- Fig. IX. NEMOTELVS NONVS.
Neunte Stiletfliege.

TABVLA LXXVII.

Sieben und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. *ELATER* *antennis setaceis* *SEPTIMVS*.
Siebender Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. II. *ELATER* *antennis setaceis* *OCTAVVS*.
Achter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. III. IV. *PHALAENA feticornis* *alis planis* *DVODECIMA*.
Zwölfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. V. *MELOLONTHA* *DECIMA*.
Zehender Sägenblattkäfer.
- Fig. VI. *DIAPERIS* *PRIMA*.
Erster Herzkäfer.
- Fig. VII. *CRYPTOCEPHALVS* *DECIMVS* *QVARTVS*.
Vierzehender Fallkäfer.
- Fig. VIII. *CRYPTOCEPHALVS* *DECIMVS* *QVINTVS*.
Fünfzehender Fallkäfer.

TABULA LXXVII.



Leibniz p. R.

Reich. Naturg. Hist.

TABULA LXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Looked p. R.

W. H. H. Haag & Co. Del.

TABVLA LXXVIII.

Acht und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. *SPHINX alis integris cauda simplici sexta.*
Sechster Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem
Schwanze.

Fig. III. *BOMBYLIVS secundus.*
Zweyte Rüsselfliege.

Fig. IV. *APIS tricesima secunda.*
Zwey und dreyßigste Biene.

Fig. V. *APIS tricesima tertia.*
Drey und dreyßigste Biene.


Fig. VI. *ASILVS decimus tertius.*
Dreyzehende Raubfliege.

TABVLA LXXIX.

Neun und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. *CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS OCTAVVS.*
Achtzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. III. *PAPILIO hexapus alis integris TERTIVS.*
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. *CIMEX quinque antennarum articulis VICESIMVS QVARTVS.*
Vier und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. *BOMBYLIVS TERTIVS.*
Dritte Rüsselfliege.
- Fig. VI. *BOMBYLIVS QVARTVS.*
Vierte Rüsselfliege.
- Fig. VII. *STENOCORVS thorace inermi SEXTVS.*
Sechster Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABULA LXXX.



Tabl. p. R.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA LXXX.


Achtzigste Tafel.

- Fig. I. **VOLVCELLA SEPTIMA.**
siebende Federbuschfliege.
- Fig. II. **ICHNEVMON QUADRAGESIMVS PRIMVS.**
Ein und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. III. **ICHNEVMON QUADRAGESIMVS SECVNDVS.**
Zwey und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. V. **SPHINX alis integris cauda simplici SEPTIMA.**
Siebender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VI. VII. **PHALAENA seticornis alis planis DECIMA TERTIA.**
Dreyzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA LXXXI.
Ein und achtzigste Tafel.

- Fig. I. MVSCA *spathula antennarum rotunda DECIMA.*
Zehende Hausfliege mit rundlichem Spatel.
- Fig. II. III. SPHEX *PRIMA.*
Erste Afterwespe.
- Fig. IV. ICHNEVMON *QUADRAGESIMVS TERTIVS.*
Drey und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. CHRYSIS *TERTIA.*
Dritte Goldwespe.
- Fig. VI. VESPA *DECIMA TERTIA.*
Dreyzehende Wespe.
- Fig. VII. APIS *TRICESIMA QVARTA.*
Vier und dreyssigste Biene.

TABULA LXXXI.



TABULA LXXXII.



Leid p R.

1744

TABVLA LXXXII
Zwey und achtzigste Tafel.


- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus atq; integris* QVARTVS.
Vierter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
-
- Fig. III. *ICHNEVMON* QVADRAGESIMVS QVARTVS.
Vier und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. *STENOCORVS thorace inermi* SEPTIMVS.
Siebender Stutzkäfer mit flachellosem Brustschilde.
- Fig. V. *STENOCORVS thorace armato* QVARTVS.
Vierter Stutzkäfer mit flachelichem Brustschilde.
- Fig. VI. *CIMEX quinque antennarum articulis* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Wanze mit funfgliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA LXXXIII.

Drey und achtzigste Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. STENOCORVS thorace inermi OCTAVVS.
Achter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. III. STENOCORVS thorace armato QVINTVS.
Fünfter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. IV. V. PHALAENA peñinicornis alis deflexis DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. VIII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und vierzigste Schlupfwespe.

TIBULA LXXXIII



Loubet p. R

Al. n.

TABVLA LXXXIV.



Loubé p. R.

WING 100

TABVLA LXXXIV.

Vier und achtzigste Tafel.

- Fig. I. STENOCORVS thorace *inermi* NONVS.
Neunter Stutzkäfer mit *stachelloſem* Bruſtſchilde.
- Fig. II. STENOCORVS thorace *inermi* DECIMVS.
Zehender Stutzkäfer mit *stachelloſem* Bruſtſchilde.
- Fig. III. STENOCORVS thorace *inermi* VNDECIMVS.
Eilfter Stutzkäfer mit *stachelloſem* Bruſtſchilde.
- Fig. IV. STENOCORVS thorace *inermi* DVODECIMVS.
Zwölfter Stutzkäfer mit *stachelloſem* Bruſtſchilde.
- Fig. V. VI. PHALAENA *feticornis* alis *deſſexis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſter Blattkäfer.
- Fig. VIII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS NONVS.
Neun und vierzigſte Schlupfwefpe.
- Fig. IX. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS.
Funfzigſte Schlupfwefpe.

TABVLA LXXXV.

Fünf und achtzigste Tafel.

- Fig. I. II. SPHEX *secunda*.
Zweyte Afterwespe.
- Fig. III. STAPHYLINVS *octavvs*.
Achter Raubkäfer.
- Fig. IV. V. PHALAENA *pestinicornis alis planis quarta*.
Fünfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. PHALAENA *pestinicornis alis planis sexta*.
Sechster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VII. LEPTVRA *thorace plano dodecima*.
Zwölfter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VIII. TABANVS *quartvs*.
Vierte Bremsenfliege.

TABVLA LXXXV.



Loubé p. R.

CSAC. 10. 108.

TABULA LXXXVI.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.

Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.

Loebel p. R.

I. G. Friedrich sc. Rat.

Tabula LXXXVI.

Sechs und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. *PHALAENA peñinicornis* alis *deflexis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangingen Flügeln.

Fig. III. *PHALAENA peñinicornis* alis *deflexis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangingen Flügeln.

Fig. IV. *CICINDELA* QUINTA.
Fünfter Zangenkäfer

Fig. V. *CLERVS* TERTIVS.
Dritter Bienenkäfer.

Fig. VI. *CRYPTOCEPHALVS* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender Fallkäfer.

Fig. VII. *CRYPTOCEPHALVS* DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Fallkäfer.

Fig. VIII. *CRYPTOCEPHALVS* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Fallkäfer.

TABVLA LXXXVII.


Sieben und achtzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *peñincornis* alis *platis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *peñincornis* alis *platis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. MVSCA *spathula* antennarum *fusiformi* SECUNDA.
Zweyte Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.
- Fig. V. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS NONVS.
Neunzehender Fallkäfer.
- Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS.
Zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis *vicesimvs* PRIMVS.
Ein und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABULA LXXXVII.



TABULA LXXXVIII.



Lond. p. R.

J. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA LXXXVIII

Acht und achtzigste Tafel.


- Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehnder länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. III. BLATTA PRIMA.
Erste Schabe.
- Fig. IV. PHALAENA *peñinicornis* alis *planis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. V. PHALAENA *peñinicornis* alis *planis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. PANORPA PRIMA.
Erste Scorpionfliege.
- Fig. VII. PANORPA SECUNDA.
Zweyte Scorpionfliege.
- Fig. VIII. IVLVS PRIMVS.
Erfter Taufendfuß.

M

TABVLA LXXXIX.
Neun und achtzigste Tafel.

- Fig. I. BOMBYLIVS QVINTVS.
Fünfte Rüsselfliege.
- Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* VNDECIMA.
Elfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. ANTHRIBVS PRIMVS.
Erster Bürstenkäfer.
- Fig. VII. OESTRVS PRIMVS.
Erste Viehfliege.
- Fig. VIII. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DECIMA TERTIA.
Dreizehende Hausfliege mit länglichem Spatel.

TABULA LXXXIX.



Lodrig. R.

I. G. Endlich & Rat.

TABULA XC.



Loebel p. R.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA XC.

Neunzigste Tafel.

Fig. I. II. *PHALAENA peñicornis* alis *deflexis* DECIMA NONA.
Neunzehnder Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängen-*
den Flügeln.

Fig. III. *PHALAENA peñicornis* alis *deflexis* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängen-*
den Flügeln.

Fig. IV. *PYROCHORA PRIMA*.
Erster Feuerkäfer.

Fig. V. VI. *PHRYGANEA QUARTA*.
Vierte Frühlingsfliege.

Fig. VII. *DITYCVS SEXTVS*.
Sechster Schwimmkäfer.


Fig. VIII. IX. *CRABRO QUARTVS*.
Vierte Kolbenfliege.

TABVLA XCI.

Ein und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis integris* QVARTVS.
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. *PAPILIO tetrapus alis integris* QVINTVS.
Fünfter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. *MVSCA spathula antennarum rotunda* VNDECIMA.
Eilfte Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. V. *VESPÄ* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Wespe.
- Fig. VI. *LOCVSTA* QVARTA.
Vierte Heuschrecke.
- Fig. VII. *MVSCA spathula antennarum fusiformi* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.
- Fig. VIII. *NEMOTELVS* DECIMVS.
Zehende Stiletfliege.

TABULA XCI.



Leibel p. R.

I. G. Friedrich sc. Rat

TABULA XCII.



Lincol. p. R.

Tab. Fend. et. R. et.

TABVLA XCII.

Zwey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. **LIBELLVLA** *alis patentibus* OCTAVA.
Achtes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. **PHALAENA** *peñinicornis* *alis deflexis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. III. **PHALAENA** *feticornis* *alis planis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. **PHALAENA** *feticornis* *alis deflexis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. V. VI. **PHALAENA** *peñinicornis* *alis deflexis* VICESIMA SECVND A.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VII. **PHALAENA** *peñinicornis* *alis deflexis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA XCIII.

Drey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis *SECUNDVS*.
Zweyter Maulwurfskäfer mit siebenpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis *TERTIVS*.
Dritter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis *VICESIMVS NONVS*.
Neun und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. PELTIS *SEXTA*.
Sechster Geiserkäfer.
- Fig. V. PELTIS *SEPTIMA*.
Siebender Geiserkäfer.
- Fig. VI. PELTIS *OCTAVA*.
Achter Geiserkäfer.
- Fig. VII. PTEROPHORVS *PRIMVS*.
Erster Fächerkäfer.
- Fig. VIII. VESPA *DECIMA QVINTA*.
Fünfzehende Wespe.

TABULA XCIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABULA XCIV.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Lodol p. R.

G. P. Trautner sc. Nov.

TABVLA XCIV.

Vier und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. **PAPILIO** *tetraps* alis *angulatis* TERTIVS.
Dritter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. **NEMOTELVS** VNDECIMVS.
Elfte Stiletfliege.
- Fig. IV. V. **SPHEX** TERTIA.
Dritte Aferwespe.
- Fig. VI. **LEPTVRA** thorace *plano* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Aferholzkäfer mit flachem Brufthilde.
- Fig. VII. **LEPTVRA** thorace *plano* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Aferholzkäfer mit flachem Brufthilde.
- Fig. VIII. **LEPTVRA** thorace *plano* DECIMA QVINTA.
Fünfzehender Aferholzkäfer mit flachem Brufthilde.

TABVLA XCV.

Fünf und neunzigste Tafel.

- Fig. I. *RAPHIDIA PRIMA.*
Erste Kameelfliege.
- Fig. II. *RAPHIDIA SECUNDA.*
Zweyte Kameelfliege.
- Fig. III. *CISTELA PRIMA.*
Erster Kegelkäfer.
- Fig. IV. *NECYDALIS SECUNDVS.*
Zweyter Fliegenkäfer.
- Fig. V. *NECYDALIS TERTIVS.*
Dritter Fliegenkäfer.
- Fig. VI. *MYLABRIS PRIMA.*
Erster Fühlspitzenkäfer.
- Fig. VII. *MYLABRIS SECUNDA.*
Zweyter Fühlspritzenkäfer.
- Fig. VIII. IX. *PHALAENA feticornis alis deflexis DECIMA QVARTA.*
Vierzehender Nachtfalter mit borsigen Fühlhörnern und abhängenden
Flügeln.

TABULA XCV.



Latet p. R

C. P. Trinitas sc. Nov.

TABULA XCVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Lodol p R

J. G. Lindsch w. Rat.

TABVLA XCVI.

Sechs und neunzigste Tafel.

- Fig. I. *COPRIS corniger* novvs.
Neunter gebürter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. II. *CICADA prima.*
Erste Schaumfliege.
- Fig. III. *CICADA secvnda.*
Zweyte Schaumfliege.
- Fig. IV. V. *SPHINX alis integris cauda simplici octava.*
Achter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VI. *CASSIDA quinta.*
Fünfter Schildkäfer.
- Fig. VII. *CICADA tertia.*
Dritte Schaumfliege.
- Fig. VIII. *CICADA quarta.*
Vierte Schaumfliege.
- Fig. IX. *TENTHREDO antennis setaceis sexta.*
Sechste Sägfiege mit borstigen Fühhörnern.

TABVLA XCVII.
Sieben und neunzigste Tafel.

- Fig. I. NOTONECTA SECUNDA.
Zweyte Wasserwanze.
- Fig. II. CORIXA PRIMA.
Erster Rückenschwimmer.
- Fig. III. IV. PAPILIO tetrapus alis integris QVINTVS.
Fünfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. V. VI. PAPILIO tetrapus alis integris SEXTVS.
Sechster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. VII. PAPILIO hexapus alis integris SEPTIMVS.
Siebender sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. VIII. IX. PAPILIO hexapus alis integris SEPTIMVS.
Siebender sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. X. XI. PAPILIO hexapus alis integris OCTAVVS.
Achter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABULA XCVII.

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. V



Fig. VII



Fig. VI



Fig. VIII



Fig. X



Fig. IX



Fig. IV




Fig. XI



Loub. & Rat.

J. G. Endrich & Rat.

TABULA XCVIII.



Londæ p. R.

W. G. sc. 22.

TABVLA XCVIII.

Acht und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. *SPHINX* *alis integris cauda simplici* NONA.
Neunter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus alis ocellatis* TERTIVS.
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit geängelten Flügeln.

Fig. V. VI. *PAPILIO hexapus alis ocellatis* QVARTVS.
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit geängelten Flügeln.

Fig. VII. VIII. *PAPILIO hexapus alis ocellatis* QVINTVS.
Fünfter sechsfüßiger Tagfalter mit geängelten Flügeln.

Fig. IX. *PAPILIO hexapus alis ocellatis* SEXTVS.
Sechster sechsfüßiger Tagfalter mit geängelten Flügeln.

TABVLA XCIX.
Neun und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. *SPHINX alis integris cauda simplici DECIMA.*
Zehender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. III. IV. *SPHINX alis integris cauda simplici VND ECIMA.*
Eilfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. V. VI. *SPHINX alis angulatis PRIMA.*
Erfter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

TABULA XCIX



Lobd. p. R.

Tab. XC.

TABVLA C.



Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. V



Fig. IV



Fig. VI

L. sub p. R.

L. v. F. v. de Rat

TABVLA C.

Hunderste Tafel.

Fig. I. SPHINX alis *angulatis* SECUNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. II. SPHINX alis *angulatis* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. IV. SPHINX alis *angulatis* QUARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. V. SPHINX alis *angulatis* QUINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. VI. SPHINX alis *angulatis* SEXTA.
Sechster Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.





